# Sistemi compatibili

(Il metodo di Fourier-Motzkin)

Claudio Arbib

Università degli Studi di L'Aquila





### Sommario

- 1. Sistemi di disequazioni lineari e poliedri
- 2. Poliedri e insiemi convessi
- 3. Disequazioni implicate
- 4. Sistemi compatibili
- 5. Proiezione di un poliedro Definizione Esempi
- 6. Teorema di Fourier
- 7. Algoritmo di Fourier-Motzkin
- 8. Applicazioni
- 9. Esempio

# 1. Sistemi di disequazioni e poliedri

#### Definizione:

Siano  $\mathbf{a} \in \mathrm{IR}^n$ ,  $b \in \mathrm{IR}$ . L'insieme

$$H = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{a}\mathbf{x} = b \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

si dice iperpiano. L'insieme

$$S = \{ \mathbf{x} \in \mathrm{IR}^n : \mathbf{a}\mathbf{x} \le b \} \subseteq \mathrm{IR}^n$$

si dice semispazio chiuso.

#### **Definizione**:

L'intersezione di un numero finito m di semispazi chiusi di  $IR^n$  definisce un poliedro di  $IR^n$ .

Quindi  $\forall$   $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$  l'insieme

$$P(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\mathbf{x} < \mathbf{b} \} \subseteq \mathbb{R}^n$$

definisce un poliedro. In particolare,  $\emptyset$ , H, S,  $IR^n$  sono poliedri.

### 2. Poliedri e insiemi convessi

#### **Definizione**:

Osserviamo che non tutti i poliedri di IR<sup>n</sup> si possono rappresentare algebricamente con un sistema di disequazioni lineari. Ad esempio questa stella:

#### **Definizione:**

 $S \subseteq IR^n$  è convesso se, comunque si prendano  $\mathbf{y}, \mathbf{z} \in S$ , il punto  $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{y} + (1 - \alpha)\mathbf{z} \in S$  per ogni scelta di  $\alpha$  in [0, 1].


Teorema:  $P(\mathbf{A}, \mathbf{b})$  è un poliedro convesso.

Dimostrazione: Siano y,  $\mathbf{z} \in P(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ , cioè  $\mathbf{A}\mathbf{y} \leq \mathbf{b}$ ,  $\mathbf{A}\mathbf{z} \leq \mathbf{b}$ . Posto  $\mathbf{x} = \alpha \mathbf{y} + (1 - \alpha)\mathbf{z}$ , si ha  $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}[\alpha \mathbf{y} + (1 - \alpha)\mathbf{z}] = \alpha \mathbf{A}\mathbf{y} + (1 - \alpha)\mathbf{A}\mathbf{z}$ . Per ogni  $\alpha$  scelto in [0, 1], tanto  $\alpha$  quanto  $1 - \alpha$  risultano  $\geq 0$ : quindi servendosi dell'ipotesi su  $\mathbf{y}$  e  $\mathbf{z}$  si può scrivere  $\alpha \mathbf{A}\mathbf{y} + (1 - \alpha)\mathbf{A}\mathbf{z} \leq \alpha \mathbf{b} + (1 - \alpha)\mathbf{b} = \mathbf{b}$ . Perciò  $\mathbf{x} \in P(\mathbf{A}, \mathbf{b})$ .

# 3. Disequazioni implicate

#### **Definizione**:

 $\beta x \le \gamma$  è una disequazione implicata dal sistema  $Ax \le b$  se ogni x che soddisfa  $Ax \le b$  soddisfa anche  $\beta x \le \gamma$ 



$$x_1 \ge 0$$

$$x_2 \ge 0$$

$$x_1 + 2x_2 \le 1$$

$$3x_1 + x_2 \le 2$$

# 3. Disequazioni implicate

#### Definizione:

Sia P un sistema di disequazioni in  $IR^n$  e P l'insieme delle sue soluzioni. Allora P è minimale se la rimozione di una sua qualsiasi disequazione restituisce un sistema il cui insieme di soluzioni contiene propriamente P.

#### Definizione:

 $\beta \mathbf{x} \le \gamma$  è combinazione conica delle disequazioni  $\mathbf{A}\mathbf{x} \le \mathbf{b} \equiv \{\mathbf{a}_i \mathbf{x} \le b_i, i = 1, ..., m\}$  se e solo se


$$(\beta, \gamma) = \sum \lambda_i(\mathbf{a}_i, b_i) \qquad \lambda_i \ge 0$$

#### Proposizione:

Ogni disequazione ottenuta come combinazione conica di  $\mathbf{A}\mathbf{x} \leq \mathbf{b}$  è una disequazione implicata.

# 3. Disequazioni implicate

#### Esempio:



$$0 (-1, 0, 0) +$$

$$0 (0, -1, 0) +$$

$$0.5 (3, 1, 2) = (2.5, 2.5, 1.5)$$

$$\lambda = (0, 0, 1, 0.5)$$

# 4. Sistemi compatibili

#### Definizione:

Un sistema di disequazioni lineari (= poliedro convesso) si dice compatibile (incompatibile) se (non) ammette soluzione.

#### Problema:

Stabilire se un dato poliedro  $P = P(\mathbf{A}, \mathbf{b})$  è o no compatibile

#### Principio:

Ciò che esiste, fa ombra

(Corollario: i vampiri non esistono)

<u>Definizione</u>: Sia  $P \subseteq IR^n$  un poliedro.

Un insieme  $P' \subseteq IR^{n-1}$  si dice proiezione di P nel sottospazio delle variabili  $x_1, ..., x_{k-1}, x_{k+1}, ..., x_n$  se

1) 
$$\forall \mathbf{w} = (w_1, ..., w_{k-1}, w_{k+1}, ..., w_n) \in P'$$
  
 $\exists z \in \text{IR tale che } (w_1, ..., w_{k-1}, z, w_{k+1}, w_n) \in P$ 

2) 
$$\forall \mathbf{u} = (u_1, ..., u_{k-1}, u_k, u_{k+1}, ..., u_n) \in P$$
  
il vettore  $(u_1, ..., u_{k-1}, u_{k+1}, ..., u_n) \in P$ 

#### Esempio:


P: 
$$x_1 \ge 0$$
,  $x_2 \ge 0$ ,  $3x_1 + 2x_2 \le 6$   
P':  $0 \le x_1 \le 2$   
poniamo  $z = (6 - 3x_1)/2 \ge 0$   $\forall x_1 \in P'$   
evidentemente  $(x_1, (6 - 3x_1)/2) \in P$   $\forall x_1 \in P'$ 

#### Esempio:

 $P: x_1 \ge 0 \qquad x_2 \ge 0 \qquad 3x_1 + 2x_2 \le 6$ 

$$3x_1 + 2x_2 \le 6$$

 $P': 0 \le x_1 \le 2$ 



 $\forall x_1 \in P', \exists z: (x_1, z) \in P$ 


 $\Rightarrow$  P'è proiezione di P

#### Esempio:

 $P: x_1 \ge 0 \qquad x_2 \ge 1 \qquad 3x_1 + 2x_2 \le 6$ 

$$3x_1 + 2x_2 \le 6$$

P':  $0 \le x_1 \le 2$ 




 $\not\exists \mathbf{y} \in P \text{ tale che } y_1 = 2$ 

 $\Rightarrow$  P' non è proiezione di P perché non è verificata la (1)

#### Esempio:

 $P: x_1 \ge 0 \qquad x_2 \ge 1 \qquad 3x_1 + 2x_2 \le 6$ 

 $P': 0 \le x_1 \le 4/3$ 




P'è proiezione di P

#### Esempio:

 $P: x_1 \ge 0 \qquad x_2 \ge 1 \qquad 3x_1 + 2x_2 \le 6$ 

$$3x_1 + 2x_2 \le 6$$

 $P': 0 \le x_1 \le 1$ 



$$\exists (u_1, u_2) \in P: u_1 \notin P'$$

 $\Rightarrow$  P' non è proiezione di P perché non è verificata la (2)

Sia dato il poliedro *P* 

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2$$

$$\dots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m$$

Dividiamo l'insieme delle righe *R* in 3 sottoinsiemi:

$$R_0 = \{i \in R: a_{i1} = 0\}, R^+ = \{i \in R: a_{i1} > 0\}, R^- = \{i \in R: a_{i1} < 0\}$$

Costruiamo un nuovo poliedro P' contenente:

- 1) tutte le diseguaglianze di  $R_0$
- 2) una diseguaglianza per ogni elemento in  $R^+ \times R^-$

• Una disequazione del tipo (2) è associata a una riga  $h \in R^+$  e una riga  $k \in R^-$ 

$$a_{h1}x_1 + a_{h2}x_2 + \dots + a_{hn}x_n \le b_h < rightarrow riga h$$
 $a_{k1}x_1 + a_{k2}x_2 + \dots + a_{kn}x_n \le b_k < rightarrow riga k$ 

- La disequazione di P' si ottiene per combinazione conica delle due
  - dividendo la prima per  $a_{h1}$
  - dividendo la seconda per  $|a_{k1}|$
  - sommandole insieme

$$\left(\frac{a_{h1}}{a_{k1}} + \frac{a_{k1}}{|a_{k1}|}\right) x_1 + \left(\frac{a_{h2}}{a_{h1}} + \frac{a_{k2}}{|a_{k1}|}\right) x_2 + \dots + \left(\frac{a_{hn}}{a_{h1}} + \frac{a_{kn}}{|a_{k1}|}\right) x_n \le \left(\frac{b_h}{a_{h1}} + \frac{b_k}{|a_{k1}|}\right)$$

• Il nuovo sistema di disequazioni P' non contiene la variabile  $x_1$ 

Teorema (Fourier) P'è una proiezione di P nello spazio delle variabili  $x_2, ..., x_n$ .

#### Dimostrazione

- Sia  $\mathbf{w} = (w_2, ..., w_n) \in P'$ . Dobbiamo mostrare che esiste uno scalare z tale che  $(z, w_2, ..., w_n) \in P$ .
- Per ogni  $i \in R_0$  si ha  $a_{i2}w_2 + ... + a_{in}w_n \le b_i$
- Per ogni  $h \in R^+$ ,  $k \in R^-$  si ha inoltre

$$\left(\frac{a_{h2}}{a_{h1}} + \frac{a_{k2}}{|a_{k1}|}\right) w_2 + \ldots + \left(\frac{a_{hn}}{a_{h1}} + \frac{a_{kn}}{|a_{k1}|}\right) w_n \le \left(\frac{b_h}{a_{h1}} + \frac{b_k}{|a_{k1}|}\right)$$

• Riscriviamo l'ultima condizione

$$\frac{a_{k2}w_2}{|a_{k1}|} + \ldots + \frac{a_{kn}w_n}{|a_{k1}|} - \frac{b_k}{|a_{k1}|} \le \frac{b_h}{a_{h1}} - \frac{a_{h2}w_2}{a_{h1}} - \frac{a_{hn}w_n}{a_{h1}}$$

- Al variare di k in  $R^-$  (di h in  $R^+$ ) il primo (secondo) membro descrive una classe C (una classe D) di numeri reali, e tutti gli elementi di C risultano  $\leq$  degli elementi di D
- Dunque esiste un elemento di separazione z tale che:

$$\frac{a_{k2} w_2}{|a_{k1}|} + \dots + \frac{a_{kn} w_n}{|a_{k1}|} - \frac{b_k}{|a_{k1}|} \le z \qquad \forall k \in R^-$$

$$\forall h \in R^+ \qquad z \le \frac{b_h}{a_{h1}} - \frac{a_{h2} w_2}{a_{h1}} - \frac{a_{hn} w_n}{a_{h1}}$$

• Le ultime due disequazioni si possono riscrivere:

$$a_{k1}z + a_{k2}w_2 + \dots + a_{kn}w_n \le b_k$$
  $\forall k \in \mathbb{R}^ a_{h1}z + a_{h2}w_2 + \dots + a_{hn}w_n \le b_h$   $\forall h \in \mathbb{R}^+$ 

• Inoltre,  $\forall i \in R_0$  si ha

$$0z + a_{i2}w_2 + \dots + a_{in}w_n \leq b_i$$

- Ne segue che  $(z, w_2, ..., w_n) \in P$
- Viceversa, siccome P' è fatto di disequazioni implicate da P, ogni soluzione di P è soluzione anche di P'.

Fine della dimostrazione

## 7. Algoritmo di Fourier-Motzkin

- Il Teorema di Fourier permette di ridurre il problema di decidere se un poliedro è o meno vuoto a quello di decidere se è o meno vuota una sua proiezione
- Poiché la proiezione di un poliedro è ancora un poliedro, il teorema può essere ripetutamente applicato, fino a pervenire a un poliedro del quale sia semplice decidere
- Ad esempio, si può applicare il teorema n-1 volte: in questo caso il poliedro risultante  $P^{(n-1)}$  sarà un intervallo dell'asse reale, eventualmente vuoto o illimitato
- Ovvero, si può applicare il teorema per n volte: in questo caso il poliedro risultante  $P^{(n)}$  avrà la forma  $\mathbf{0} \cdot \mathbf{x} \leq \mathbf{t}$ . Si danno allora 2 casi:
  - se  $\mathbf{t} \ge 0$ ,  $P^{(n)}$  è banalmente compatibile, in quanto descrive l'intero IR<sup>n</sup>, e quindi anche P è compatibile;
  - se esiste un indice i tale che  $t_i < 0$ , allora  $P^{(n)}$  è banalmente incompatibile, e così P.

## 8. Applicazioni

Il metodo di eliminazione di Fourier-Motzkin si può applicare per

- Decidere se un poliedro è vuoto oppure no
- Costruire la rappresentazione implicita di conv(S) per un insieme finito  $S \subset IR^n$
- Risolvere un problema di Programmazione Lineare

Sia P il poliedro costituito dalle  $\mathbf{x} \in \mathbb{IR}^3$  tali che

$$3x_1 - x_2 \le 4$$
 $x_1 - 2x_3 \le -6$ 
 $2x_1 + 2x_2 + x_3 \le 2$ 
 $x_1 \ge 0$ 

Vogliamo capire se  $P \neq \emptyset$ 

Riportiamo tutte le diseguaglianze in forma di ≤, e costruiamo una tabella contenente i coefficienti del sistema

1)	3	<b>-1</b>	0	4
2)	1	0	-2	-6
3)	2	2	1	2
4)	-1	0	0	0

(in colore rosso sono riportati i termini noti in blu gli indici di riga)

Scegliamo una variabile (colonna) da eliminare. La scelta può essere effettuata in base al numero di nuove righe generate dall'eliminazione.

- Dall'eliminazione della colonna 1 nascono  $3 \times 1 = 3$  nuove righe.
- Dall'eliminazione della colonna 2 o della colonna 3 ne nascono  $2 + 1 \times 1 = 3$ . Decidiamo di eliminare la colonna 2, in quanto 2 delle nuove righe provengono dall'insieme  $R_0$ , e sono pertanto già presenti in tabella.

 1)
 3
 -1
 0
 4

 2)
 1
 0
 -2
 -6

 3)
 2
 2
 1
 2

 4)
 -1
 0
 0
 0

Gli insiemi  $R_0$ ,  $R^+$  e  $R^-$  risultano così costituiti:

$$S_0 = \{2, 4\}$$
  $S^+ = \{3\}$   $S^- = \{1\}$ 

Pertanto,  $R^+ \times R^-$  contiene la sola coppia 31.

La riga corrispondente si ottiene moltiplicando per 2 la riga 1 e sommandola alla riga 3. La tabella si riscrive

 2)
 1
 0
 -2
 -6

 4)
 -1
 0
 0
 0

 31)
 8
 0
 1
 10

Rinumeriamo le righe della tabella ottenuta.

Conviene ora applicare il metodo alla colonna 3. Si ha

$$R_0 = \{2\}, R^+ = \{3\}, R^- = \{1\}$$

e ancora una volta  $R^+ \times R^-$  contiene la sola coppia 31.

La riga corrispondente si ottiene moltiplicando per 2 la riga 3 e sommandola alla riga 1. La tabella si riscrive

31)

Questa tabella corrisponde al sistema

$$1) x_1 \geq 0$$

$$2) 17x_1 \leq 14$$

La proiezione P" di P sull'asse  $x_1$  è dunque rappresentata dall'intervallo (non vuoto) [0, 14/17]. Quindi anche P è non vuoto. In particolare possiamo ottenere un punto di P scegliendo un  $x_1 \in P$ " e ricavando  $x_2$  e  $x_3$  in base alle tabelle precedenti.

Poniamo ad esempio  $x_1 = 0$ . Dalla prima tabella della pagina precedente ricaviamo le condizioni

1) 
$$-2x_3 \le -6$$
 cioè  $x_3 \ge 3$   
3)  $x_3 \le 10$ 

$$x_3 \leq 10$$

Quindi  $x_3 \in [3, 10]$ . Possiamo scegliere ad esempio  $x_3 = 4$ .

Sostituendo ora  $x_1 = 0$  e  $x_3 = 4$  nella tabella iniziale

ricaviamo le condizioni

$$-x_2 \leq 4$$
  
$$2x_2 + 4 \leq 2$$

vale a dire  $x_2 \in [-4, -1]$ . Una soluzione del sistema è quindi ad esempio

$$x_1 = 0$$
  $x_2 = -1$   $x_3 = 4$