

## Metodo delle due fasi

- ▶ Il problema artificiale
- ▶ la fase I del Simplex
- ▶ esempi

rif. Fi 3.2.5;

## Problema artificiale

Dato un problema in forma standard  $\min\{\mathbf{c}^T \mathbf{x} : \mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ , con  $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$ , definiamo *problema artificiale*:

$$w = \min \sum_{i=1}^m y_i$$

s.t.

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{Iy} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}$$

le variabili  $\mathbf{y}$  sono dette *artificiali*.

## Esempio

$$\min 3x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

s.t.

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\min y_1 + y_2$$

s.t.

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 + y_1 = 1$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + y_2 = 2$$

$$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 \geq 0$$

da cui il tableau:

0	0	0	1	1	0
1	3	4	1	0	1
2	1	3	0	1	2

sottraendo alla riga 0 le altre:

-3	-4	-7	0	0	-3
1	3	4	1	0	1
2	1	3	0	1	2

$y_1$

$y_2$

forma canonica

## Fase I

Possiamo quindi risolvere il problema artificiale col Metodo del Simplex, ottenendo la soluzione  $(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$  di valore  $w^*$ . Sono possibili 2 casi:

- ▶  $w^* > 0$  non esiste una soluzione del prob. artificiale con  $y_i = 0, i = 1, \dots, m$ , quindi il sistema  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}$  non ammette soluzione: il problema originale è inammissibile
- ▶  $w^* = 0$  quindi  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$  e  $\mathbf{x}^*$  è sol. ammissibile del problema originale.

2 sottocasi per il tableau ottimo:

- (a) tutte le variabili artificiali sono fuori base
- (b) esiste una variabile  $y_h$  in base

## Caso 2a: variabili artificiali fuori base

- ▶ eliminando le colonne corrispondenti alle var. artificiali il tableau in forma canonica risp. a una base
- ▶ sostituire la f.o. artificiale con quella originaria, portare la riga 0 in forma canonica
- ▶ applicare il Metodo del Simplex (Fase II)

## Esempio (continua)

scegliamo la var. entrante  $x_3$  e  $t = \arg \min\{1/4, 2/3\} = 1 \implies$  var. uscente  $y_1$

-3	-4	-7	0	0	-3
1	3	<b>4</b>	1	0	1
2	1	3	0	1	2

*PIVOT*  
 $y_1$  ( $t = 1, 3$ )  
 $y_2 \implies$

-5/4	5/4	0	7/4	0	-5/4
1/4	3/4	1	1/4	0	1/4
<b>5/4</b>	-5/4	0	-3/4	1	5/4

$x_3$   
 $y_2$

scegliamo la var. entrante  $x_1$  e  $t = \arg \min\{1, 1\} = 2 \implies$  var. uscente  $y_2$

*PIVOT*  
 $(t = 2, 1)$   
 $\implies$

0	0	0	1	1	0
0	1	1	2/5	-1/4	0
1	-1	0	-3/5	4/5	1

$x_3$   
 $x_1$

soluzione ottima  
(1, 0, 0, 0, 0) di valore 0

## Esempio (continua)

le variabili  $y_1, y_2$  sono fuori base, quindi eliminiamo le corrisp. colonne e ripristiniamo la f.o. originaria

3	4	6	0
0	1	1	0
1	-1	0	1

$x_3$

$x_1$

mettiamo in forma canonica sommando alla riga 0 le righe 1 e 2 moltiplicate per  $-6$  e  $-3$  risp.

0	1	0	-3
0	1	1	0
1	-1	0	1

$x_3$

$x_1$

eseguiamo quindi la FASE II:  $\mathbf{c} \geq \mathbf{0} \implies (1, 0, 0)$  è soluzione ottima

## Caso 2b: variabile $y_h$ in base

essendo  $w^* = 0$  deve essere  $y_h^* = 0$ , quindi abbiamo un caso degenere. Se  $h = B(i)$ , si ha:

$x_1$	$\cdots$	$x_j$	$\cdots$	$x_n$	$y_1$	$\cdots$	$y_h$	$\cdots$	$y_n$	$ $	$0$	$-w$
							$0$				$0$	
		$\vdots$					$\vdots$				$0$	
$\bar{a}_{i1}$		$\bar{a}_{ih}$		$\bar{a}_{in}$			$1$			$0$	$y_h$	
							$0$					
		$\vdots$					$\vdots$					
							$0$					

## Caso 2b: variabile $y_h$ in base

- se esiste un  $\bar{a}_{ij} \neq 0$ , eseguiamo  $PIVOT(i, j)$  in modo da far uscire  $y_h$  dalla base.
  - ▶ possiamo farlo anche se  $\bar{a}_{ij} < 0$  in quanto  $\bar{\mathbf{b}}_i = 0$ , quindi rimane  $\bar{\mathbf{b}} \geq \mathbf{0}$
  - ▶ il valore  $w = w^*$  non cambia
- ripetendo il procedimento per tutte le var artificiali in base ci si riconduce al caso (2a).
- se invece tutti i valori  $\bar{a}_{i1}, \dots, \bar{a}_{in}$  sono nulli, eliminando le var artificiali si ottiene una riga del tableau tutta nulla, cioè la corrispondente equazione era ottenibile come combinazione lineare delle altre e può essere eliminata ( $\equiv \mathbf{A}$  non ha rango  $m$ )

## Esempio

$$\min 7x_1 - 3x_2 - 6x_3$$

s.t.

$$3x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$\min y_1 + y_2$$

s.t.

$$3x_1 - 4x_2 - 2x_3 + y_1 = 3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + y_2 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 \geq 0$$

da cui il tableau:

0	0	0	1	1	0
3	-4	-2	1	0	3
1	1	1	0	1	1

sottraendo alla riga 0 le altre:

-4	3	1	0	0	-4
3	-4	-2	1	0	3
1	1	1	0	1	1

$y_1$

$y_2$

forma canonica

## Esempio

scegliamo la var. entrante  $x_1$  e  $t = \arg \min\{1, 1\} = 2 \implies$  var. uscente  $y_2$

-4	3	1	0	0	-4	$y_1$	<i>PIVOT</i>	0	7	5	0	4	0	$y_1$
3	-4	-2	1	0	3	$y_2$	$(t = 2, 1)$	0	-7	-5	1	-3	0	$y_1$
1	1	1	0	1	1	$y_2$	$\implies$	1	1	1	0	1	1	$x_1$

OSS. la var artificiale  $y_1$  rimane in base nel tableau ottimo del problema artificiale. Eseguiamo quindi un nuovo pivot:

<i>PIVOT</i>	0	0	0	1	1	0	
$(t = 1, 3)$	0	7/5	1	-1/5	3/5	0	$x_3$
$\implies$	1	-2/5	0	1/5	-2/5	1	$x_1$

tutte le var. artificiali sono fuori base

## Esempio

eliminiamo le var. artificiali e ripristiniamo la funzione obiettivo originaria:

7	-3	-6	0
0	$7/5$	1	0
1	$-2/5$	0	1

in forma  
canonica



0	$41/5$	0	-7
0	$7/5$	1	0
1	$-2/5$	0	1

Inizia FASE II:

**STOP:  $(1, 0, 0)$  soluzione ottima**